



Situácia:

Teplé počasie a lokálne zrážky naštartovali porasty plodín, najmä slnečníc. Prírastky pravých listov pribúdajú každým dňom. Niektoré porasty sa nachádzajú v štádiu 4 - 6 pravých listov. Svojou rastovou fázou sa blížia k termínu prvých fungicídnych zásahov.

Väčšina pestovateľov si už zvykla k fungicídom pridávať prípravky s obsahom mikroprvkov. Tieto Aktuality sú zamerané na stimuláciu a listovú výživu porastov slnečníc.

Základné doporučenie - stimulácia:

BOROSTIM 2,5 lt/ha (cca 11,45 €/ha)

- stimulačné látky pôsobiace ako prekurzory auxínov
- 3% B - vodorozpustný bór ako bórethanolamin
- vodorozpustný Mo ako EDTA chelát

Aplikácia spolu s fungicídnym ošetrením. Je možné i spojenie s listovou výživou, i keď v prípade aplikácie Borostimu dodávka B a Mo už je vyriešená.



Základné doporučenie - listová výživa

FOLIT B 1,0 lt/ha (cca 2,97 €/ha)


- 150 g/lt B - vodorozpustný bór ako bórethanolamin

Tam kde nie je použitý Borostim.

FOLIT S 2,0 lt/ha (cca 7,78 €/ha)

- 450 g/lt S
- 66 g/lt MgO

System stimulácie a listovej výživy prípravkami Chemap agro



Technicko